

### Formulario de consentimiento para padres

La ley estatal de California exige que los estudiantes de 16 años de edad que deseen donar sangre tengan el consentimiento por escrito de sus padres antes de la donación. Algunos distritos escolares exigen que todos los estudiantes tengan el consentimiento por escrito de sus padres a fin de donar. Si te entregaron este formulario, tu padre, madre o tutor debe completarlo y firmarlo **con tinta negra o azul únicamente** (no se aceptarán formularios completados con lápiz). Presenta este formulario completado al encargado de registros de Delta Blood Bank o al personal escolar que corresponda antes de donar sangre.

\_\_\_\_\_  
(Apellido del donante, nombre, inicial del segundo nombre)

\_\_\_\_\_  
(Fecha de nacimiento)

\_\_\_\_\_  
(N.º telefónico de contacto del padre, madre o tutor)

Estimado padre, madre o tutor:

Le pedimos que lea la siguiente información antes de otorgar su consentimiento para que la persona indicada anteriormente done sangre.

- Los donantes deben pesar al menos 115 lb (si tienen 16 años de edad) o 110 lb (si tienen 17 años de edad o más).
- Es aceptable el uso de Aspirina, Motrin u otros medicamentos antiinflamatorios.
- Es aceptable el uso de medicamentos para la presión arterial si su presión arterial no está por encima de 180/100 al momento de la donación.
- Es aceptable el uso de comprimidos para la diabetes.
- Es aceptable el uso de insulina si su condición es estable y no tiene síntomas de enfermedad cardiovascular.
- Son aceptables las perforaciones en las orejas, siempre y cuando se hayan hecho con agujas estériles desechables.
- Perforaciones corporales: Llame a Delta Blood Bank y pida comunicarse con un integrante del personal de enfermería a cargo antes de venir a donar.
- Después de la aplicación de un tatuaje, es necesario esperar un año para poder donar sangre.
- Puede donar sangre si ha tenido fiebres (o aftas) o ampollas febriles, pero es necesario que hayan cicatrizado.
- Puede donar sangre si ha tenido herpes, siempre y cuando las úlceras hayan cicatrizado.
- Puede donar sangre si utiliza medicamentos antidepresivos.
- En general, puede donar sangre si utiliza medicamentos para la artritis.
- No puede donar sangre si utiliza Accutane, Proscar y Propecia. Es posible que estos fármacos sean perjudiciales para quienes reciben la sangre. Le pedimos que no done sangre si está utilizando alguno de estos medicamentos.
- En el caso de inmunizaciones o vacunas recientes, las evaluaciones se remitirán al integrante del personal de enfermería a cargo (la mayoría de las vacunas no son causa de remisión).
- Si una persona tiene actividades que la hagan correr riesgo de exposición al virus de VIH, no puede donar sangre.
- Si vivió en el Reino Unido durante más de tres meses desde 1980 hasta 1996, no puede donar sangre.

Si tiene preguntas específicas acerca de los requisitos, llame al 1-888-94BLOOD (25663)

\_\_\_\_\_  
(Firma del padre, madre o tutor)

\_\_\_\_\_  
(Fecha)

Esta casilla es exclusivamente para uso de la escuela:

Se contactó al padre o madre: SÍ

NO

Iniciales: \_\_\_\_\_